



IMMUNOLÓGIAI ÉS
BIOTECHNOLÓGIAI
INTÉZET



13. gyakorlat: Autoantitest diagnosztika



Az immunológia alapjai

PTE-KK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
Pécs, 2020.

Az autoimmunitás

- Autoimmunitás: Az immunrendszer **saját struktúrát ismer fel** és azzal reagál.



Természetes autoimmunitás

- Immunregulációban vesz részt
- Külső stimulus nélküli antitest termelés
- **Természetes autoantitestek:**
 - Alacsony affinitású
 - Polispecifikus
 - Zömmel IgM
 - Alacsony szérum koncentráció
 - **B1 B-sejtek** termelik



Patológiás autoimmunitás

- Valamelyen kórfolyamatot eredményez vagy azzal társul
- **Patológiás autoantitestek:**
 - Nagy affinitású
 - Monospecifikus
 - Zömmel IgG
 - Magas szérum koncentráció
 - **B2 B-sejtek** termelik




Természetes autoantitestek célpontjai

- **Evolucionálisan konzervált**, szinte az összes sejtben megtalálható struktúrák ellen, pl.:
 - Hősokk fehérjék
 - Cytoskeleton fehérjéi
 - Fontos metabolikus enzimek
 - Sejtmagi struktúrák
- Feltételezett szerep: **Immuntolerancia fenntartása**, saját antigének eltakarítása (pl. DAMP: Damage-associated molecular pattern), patológiás autoimmunitás megakadályozása
- Az egyes egyénekben előforduló természetes autoantitestek folyamatosan jelen vannak, repertoárjuk kortól és nemtől függetlenül konstans, az **egyénre jellemző**.




Immunológiai homunculus vagy más néven Immunculus




Apooptotikus testek eltakarítása

- Apoptotikus sejtek opszonizációja, fagocitózis Fc és komplement receptorokon keresztül.




Autoimmun betegségek

- A teljes lakosság 7-8 százalékában fordulnak elő.
- Többségükre erős **női dominancia** jellemző. (pl. SLE-ben 1:9 a férfi:nő arány)
- Sokuk jellemzően **fiatal, munkaképes korban** jelentkezik.
- Gyakran halmozottan fordulnak elő. → **Poliautoimmunitás** (pl. SLE 41 százalékban társul valamilyen másik autoimmun betegséggel)
- **Krónikus betegségek!**
- Kialakulásuk:




Molekuláris mimikri


A kórokozó antigénje **szerkezeti hasonlóságot** mutat saját struktúrákkal. → Hajlamosító gének mellett **autoimmun keresztreakció** jön létre. (pl. Reumás láz *Streptococcus pyogenes* fertőzést követően)



Neoantigének keletkezése



Centrális tolerancia elvesztése



Negatív szelekció

AIRE mutáció

Thymus

Autoreaktív T-sejtek kikerülnek a perifériára

APECED (Autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis - ectodermal dystrophy)

Autoimmun kórképek csoportosítása

Autoimmun betegségek

(Részletesen lásd a klinikumban.)

Szisztemás kórképek

(Egész szervezetet érintik)



Rheumatoid arthritis



Scleroderma
(Systemic sclerosis)



SLE (Systemic lupus erythematosus)



Addison-kór



Myasthenia gravis




Graves-Basedow-kór



Szerv-specifikus autoantitestek


- Egy-egy adott szerv/szövetségre specifikus betegségben fordulnak elő.
- Példák az antitestek célpontjaira szerv-specifikus körképek esetében:
 - I-es típusú cukorbetegség (IDDM): glutaminsav-dekarboxiláz (GAD), tirozin-foszfatáz-szerű fehérje (IA-2)
 - **Autoimmun pajzsmirigy-betegségek:** tireoperoxidáz (TPO), tireoglobulin
 - Goodpasture-szindróma: IV-es típusú kollagén (bazálmembrán a vesében és a tüdőben) 
 - **Myasthenia gravis:** poszt-szinaptikus nikotinerg acetilkolin receptor (neuromuszkuláris funkció)
 - **Lisztérzékenység** (=cöliákia): szöveti transzglutamináz (tTG), endomízium, gliadin (utóbbi az egyes gabonákban előforduló glutén alkotóeleme, tehát nem autoantigén!)
 - Primer biliáris cirrózis: különböző mitokondriális antigének
- Kimutatásuk **diagnosztikus** lehet és **prognosztikai jelentőséggel** bírhat, illetve alkalmas lehet a **betegség követésére**.

Myasthenia gravis




Autoimmun pajzsmirigy-betegségek

Hashimoto-thyreoiditis:




Graves-Basedow-kór:




Szisztemás betegségeket jelző autoantitestek

- Példák:
 - **Anti-nukleáris antitestek** (ANA, anti-nuclear antibody)
 - Anti-citrullinált protein antitestek (ACPA, anti-citrullinated protein antibody)
 - **Anti-neutrophil citoplazmatikus antitestek** (ANCA, anti-neutrophil cytoplasmic antibody)
 - **Rheumatoid faktor** (RF, anti-IgG antitestek, általában IgM izotípusúak, de lehet IgG vagy IgA is)
 - Anti-foszfolipid autoantitestek (pl. anti-kardiolipin, anti- β 2 glikoprotein I)
- Kimutatásuk **diagnosztikus** lehet és **prognosztikai jelentőséggel** bírhat, illetve alkalmas lehet a **betegség követésére**.



IgM izotípusú rheumatoid faktor




IgA izotípusú rheumatoid faktor

Anti-nukleáris antitestek (ANA)

- Valamilyen **sejtmagi struktúrát** ismernek fel, pl.:
 - **Kettősszálú DNS elleni antitest** (anti-dsDNA) → Elsősorban **SLE**
 - Anti-Smith (anti-SM), ribonukleoproteinek ellen → **SLE**
 - **Anti-Scl-70**, a topoizomeráz I ellen → **Scleroderma**
 - **Anti-centromer** antitestek → **Scleroderma**, primer biliaris cirrhosis
 - Anti-Ro (anti-SSA) és anti-La (anti-SSB) → Sjögren-szindróma, SLE
 - **Anti-Jo-1** a hisztidil-tRNS szintetáz ellen → **Polymyositis, dermatomyositis**
 - Anti-hiszton antitestek → Gyógyszer-indukálta SLE


Lupus nephritis



Anti-neutrofil citoplazmatikus antitestek (ANCA)


Két fő csoportjuk van:

Perinukleáris mintázat (p-ANCA)



Indirekt immunfluoreszcens
mikroszkópia

Citoplazmatikus mintázat (c-ANCA)



- Antigén: főleg a **mieloperoxidáz** (MPO)
- Példák betegségekre (lásd klinikumban):
 - Colitis ulcerosa
 - Churg-Strauss szindróma
 - Mikroszkopikus polyangiitis
 - Primer sclerotizáló cholangitis

- Antigén: főleg a **proteináz 3** (PR3)
- Példák betegségekre:
 - Wegener granulomatosis (GPA: Granulomatosis with polyangiitis)

Autoantitestek kimutatása


- **Szűrés (screening):**
 - **Direkt immunfluoreszcencia:** A beteg szövetsmintáját vizsgálják. (pl. bőrgyógyászati és nefrológiai betegségek esetén, lásd klinikumban)
 - **Indirekt immunfluoreszcencia:** A beteg szérumát vizsgálják valamelyen sejttenyészeten vagy szöveten.
 - Az egyes autoantitestek eltérő **festődési mintázatokat** adnak a különböző sejt/szövetsmintákon. (pl. homogén magfestődés, nukleoláris, centromer, mitokondriális, citoplazmatikus, stb.)
- **Antigén-specifikus diagnosztikai vizsgálatok:**
 - A szűrővizsgálat eredménye és/vagy a klinikai kép alapján, a **diagnózis megerősítésére**.
 - Módszerek:
 - **ELISA**
 - **Western blot**
 - **Radiális immundiffúzió**

} 6-8. gyakorlat




Vizsgálatok jellemzői

Immunfluoreszcencia: nem-specifikus, mintázatot ad, multiplex kép, manuális, sok autoantitest nem vizsgálható



Mi ez ?




ELISA: antigén specifikus, egyedi autoantitestek mérése, automatizálható, új autoantigének felismerése



Idő ?

Multiplex microarray technológia: antigén specifikus, komplex autoantitest mintázat, automatizálható

Gyors, specifikus




Immunfluoreszcencia I.


Direkt immunfluoreszcens vizsgálat SLE veseérintettségéről (lupus nephritis):

- Membranosus glomerulonephritis (lásd majd patológiából és nefrológiából)

1. Szövettani mintavétel a betegből




2. Glomerulus PAS-reakcióval:
megvastagodott bazálmembrán




3. Glomerulus direkt IF vizsgálata:
IgG immunkomplexek lerakódása a
bazálmembránban (III. típusú hiperszenzitivitás)


Immunfluoreszcencia II.




Anti-TPO autoantitestek kimutatása
pajzsmirigy szöveten



Mitokondriális festődési mintázat
vese szöveten




Nukleoláris magfestődés
Hep2 sejtekben (anti-SSA)



Homogén magfestődés Hep2
sejtekben (anti-dsDNA)

Immunfluoreszcencia III.


Anti-dsDNA kimutatása a beteg szérumából **indirekt immunfluoreszcens mikroszkópiával** különböző sejttípusok használatával:



HEp-20-10 sejttenyészet
(humán epiteliális tumor)



Crithidia luciliae sejtek
(protiszta parazita)




Patkány májszövet

ANAscreen - microplate ELISA

Az ELISA lemezt Hep2 sejtek magjából kivont antigének keverékével érzékenyítik:

- dsDNA
- hiszton
- centromer
- SSA/Ro, SSB/La
- Sm, Sm/RNP
- Scl-70, Jo-1

Pozitivitás esetén egy-egy antigénnel fedett külön ELISA lemezeken un. „kifejtő” vizsgálatok következnek



Hivatkozások (nincs sorban)

- Poletaev AB¹, et al.: **Immunophysiology versus immunopathology: Natural autoimmunity in human health and disease.** *Pathophysiology*. 2012 Jun;19(3):221-31. doi: 10.1016/j.pathophys.2012.07.003. Epub 2012 Aug 9.
- Nguyen TT¹, Elsner RA², Baumgarth N³: **Natural IgM prevents autoimmunity by enforcing B cell central tolerance induction.** *J Immunol*. 2015 Feb 15;194(4):1489-502. doi: 10.4049/jimmunol.1401880. Epub 2015 Jan 16.
- Binder CJ¹: **Naturally occurring IgM antibodies to oxidation-specific epitopes.** *Adv Exp Med Biol*. 2012;750:2-13. doi: 10.1007/978-1-4614-3461-0_1.
- Lutz HU¹: **Homeostatic roles of naturally occurring antibodies: an overview.** *J Autoimmun*. 2007 Dec;29(4):287-94. Epub 2007 Sep 12.
- Lutz HU¹, Binder CJ, Kaveri S: **Naturally occurring auto-antibodies in homeostasis and disease.** *Trends Immunol*. 2009 Jan;30(1):43-51. doi: 10.1016/j.it.2008.10.002. Epub 2008 Dec 4.
- Aziz M¹, et al.: **The role of B-1 cells in inflammation.** *Immunol Res*. 2015 Dec;63(1-3):153-66. doi: 10.1007/s12026-015-8708-3.
- Savage HP^{1,2}, Baumgarth N^{1,2,3}: **Characteristics of natural antibody-secreting cells.** *Ann N Y Acad Sci*. 2015 Jun 23. doi: 10.1111/nyas.12799.
- Grönwall C¹, Vas J, Silverman GJ: **Protective Roles of Natural IgM Antibodies.** *Front Immunol*. 2012 Apr 4;3:66. doi: 10.3389/fimmu.2012.00066. eCollection 2012.
- Elkorn K¹, Casali P: **Nature and functions of autoantibodies.** *Nat Clin Pract Rheumatol*. 2008 Sep;4(9):491-8. doi: 10.1038/ncprheum0895.
- Grönwall C¹, Silverman GJ: **Natural IgM: beneficial autoantibodies for the control of inflammatory and autoimmune disease.** *J Clin Immunol*. 2014 Jul;34 Suppl 1:S12-21. doi: 10.1007/s10875-014-0025-4. Epub 2014 Apr 2.
- Cohen IR¹: **Biomarkers, self-antigens and the immunological homunculus.** *J Autoimmun*. 2007 Dec;29(4):246-9. Epub 2007 Sep 20.

Hivatkozások

- Vas J¹, Grönwall C, Silverman GJ: **Fundamental roles of the innate-like repertoire of natural antibodies in immune homeostasis.** *Front Immunol.* 2013 Feb 5;4:4. doi: 10.3389/fimmu.2013.00004. eCollection 2013.
- Xu X¹, et al.: **Human-derived natural antibodies: biomarkers and potential therapeutics.** *Future Neurol.* 2015;10(1):25-39.
- Casali P¹, Schettino EW: **Structure and function of natural antibodies.** *Curr Top Microbiol Immunol.* 1996;210:167-79.
- Panda S¹, Ding JL²: **Natural antibodies bridge innate and adaptive immunity.** *J Immunol.* 2015 Jan 1;194(1):13-20. doi: 10.4049/jimmunol.1400844.
- Mannoor K¹, Xu Y, Chen C: **Natural autoantibodies and associated B cells in immunity and autoimmunity.** *Autoimmunity.* 2013 Mar;46(2):138-47. doi: 10.3109/08916934.2012.748753. Epub 2013 Jan 10.
- Madi A¹, et al.: **The natural autoantibody repertoire in newborns and adults: a current overview.** *Adv Exp Med Biol.* 2012;750:198-212. doi: 10.1007/978-1-4614-3461-0_15.
- Kaveri SV¹: **Intravenous immunoglobulin: exploiting the potential of natural antibodies.** *Autoimmun Rev.* 2012 Sep;11(11):792-4. doi: 10.1016/j.autrev.2012.02.006. Epub 2012 Feb 12.
- Choi YS¹, et al.: **B-1 cells in the bone marrow are a significant source of natural IgM.** *Eur J Immunol.* 2012 Jan;42(1):120-9. doi: 10.1002/eji.201141890. Epub 2011 Nov 28.
- Rahyab AS¹, et al.: **Natural antibody - Biochemistry and functions.** *Glob J Biochem.* 2011;2(4):283-288.
- Baumgarth N¹: **The double life of a B-1 cell: self-reactivity selects for protective effector functions.** *Nat Rev Immunol.* 2011 Jan;11(1):34-46. doi: 10.1038/nri2901. Epub 2010 Dec 10.
- Chan AY^{1,2}, Anderson MS¹: **Central tolerance to self revealed by the autoimmune regulator.** *Ann N Y Acad Sci.* 2015 Nov;1356:80-9. doi: 10.1111/nyas.12960.

Hivatkozások

- Anaya JM¹: **The diagnosis and clinical significance of polyautoimmunity.** *Autoimmun Rev.* 2014 Apr-May;13(4-5):423-6. doi: 10.1016/j.autrev.2014.01.049. Epub 2014 Jan 11.
- Pisetsky DS¹: **Anti-DNA antibodies - quintessential biomarkers of SLE.** *Nat Rev Rheumatol.* 2015 Nov 19. doi: 10.1038/nrrheum.2015.151.
- Czömpöly T¹, et al.: **Anti-topoisomerase I autoantibodies in systemic sclerosis.** *Autoimmun Rev.* 2009 Jul;8(8):692-6. doi: 10.1016/j.autrev.2009.02.018. Epub 2009 Feb 13.
- Nihtyanova SI¹, Denton CP: **Autoantibodies as predictive tools in systemic sclerosis.** *Nat Rev Rheumatol.* 2010 Feb;6(2):112-6. doi: 10.1038/nrrheum.2009.238.
- Liberal R¹, et al.: **Diagnostic and clinical significance of anti-centromere antibodies in primary biliary cirrhosis.** *Clin Res Hepatol Gastroenterol.* 2013 Dec;37(6):572-85. doi: 10.1016/j.clinre.2013.04.005. Epub 2013 Jul 19.
- Zampieri S¹, et al.: **Anti-Jo-1 antibodies.** *Autoimmunity.* 2005 Feb;38(1):73-8.
- Aggarwal A¹: **Role of autoantibody testing.** *Best Pract Res Clin Rheumatol.* 2014 Dec;28(6):907-20. doi: 10.1016/j.bepr.2015.04.010. Epub 2015 May 23.
- Csernok E¹, Moosig F¹: **Current and emerging techniques for ANCA detection in vasculitis.** *Nat Rev Rheumatol.* 2014 Aug;10(8):494-501. doi: 10.1038/nrrheum.2014.78. Epub 2014 Jun 3.
- Poletaev AB¹, Stepanyuk VL, Gershwin ME: **Integrating immunity: the immunculus and self-reactivity.** *J Autoimmun.* 2008 Feb-Mar;30(1-2):68-73. doi: 10.1016/j.jaut.2007.11.012.
- Poletaev AB¹: **The immunological homunculus (immunculus) in normal state and pathology.** *Biochemistry (Mosc).* 2002 May;67(5):600-8.